



Datum : 17 september 2009

Aanvulling advies vaccinatie influenza A/H1N1 2009

De Gezondheidsraad en het RIVM hebben op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal aanvullende vragen over vaccinatie tegen influenza A/H1N1 2009 beantwoord. Het aanvullende advies is het vaccin ook beschikbaar te stellen aan gezonde zwangere vrouwen vanaf de vierde maand van de zwangerschap. Verder adviseren de deskundigen om twee vaccindoses te handhaven.

Aanvulling advies vaccinatie influenza A/H1N1 2009

De Gezondheidsraad en het RIVM hebben op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal aanvullende vragen over vaccinatie tegen influenza A/H1N1 2009 beantwoord. Het aanvullende advies is het vaccin ook beschikbaar te stellen aan gezonde zwangere vrouwen vanaf de vierde maand van de zwangerschap. Verder adviseren de deskundigen om twee vaccindoses te handhaven.

Aanbevolen groepen voor vaccinatie

De groepen waarvoor in het advies van 17 augustus 2009 vaccinatie werd aanbevolen zijn niet veranderd. Deze groepen zijn:

- mensen die uitgenodigd worden voor de jaarlijkse grieprik
 - mensen van alle leeftijden met medisch risico
 - mensen van 60 jaar en ouder
- zwangere vrouwen met medisch risico in de laatste zes maanden van de zwangerschap
- gezondheidspersoneel dat mogelijk contact heeft met patiënten uit de medische risicogroepen
- mantelzorgers van mensen met een zeer hoog risico op ernstige ziekte en sterfte door deze griep.

Vaccinatie gezonde zwangere vrouwen

De deskundigen bevelen aan om het vaccin ook beschikbaar te stellen aan gezonde zwangere vrouwen vanaf de vierde maand van de zwangerschap. Uit gegevens uit andere landen waar de nieuwe influenza zich al meer verspreid heeft, blijkt consistent dat zwangeren een verhoogd risico hebben op complicaties als gevolg van deze griep, ook in afwezigheid van al bestaande risicofactoren. Op grond van deze gegevens menen de deskundigen dat ook voor gezonde zwangere vrouwen de vaccinatie tegen deze griep beschikbaar moet zijn. Vaccinatie in de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt ontraden omdat op theoretische gronden een risico van vaccinatie in deze periode voor het kind niet kan worden uitgesloten.

Twee keer vaccineren

De Gezondheidsraad en het RIVM adviseren om bij vaccinaties tegen influenza A/H1N1 2009 twee prikmomenten te handhaven. De studies waaruit zou blijken dat één inenting voldoende is, zijn onvoldoende overtuigend (de onderzoeksgroepen zijn bijvoorbeeld zeer klein en omvatten geen mensen met een hoger risico).

Vaccinatie tegen seizoensgriep en influenza A/H1N1 2009

Naast de vaccinatie tegen de influenza A/H1N1 2009 blijft ook de jaarlijkse vaccinatie tegen de seizoensgriep van belang. Mensen die normaal gesproken een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse griep prik krijgen dit jaar dus in totaal drie prikken aangeboden: één voor de jaarlijkse griep prik en twee voor de vaccinatie tegen influenza A/H1N1 2009. Tussen de vaccinatie voor de jaarlijkse griep prik en de eerste vaccinatie tegen influenza A/H1N1 2009 zit bij voorkeur twee weken. Tussen de eerste en de tweede vaccinatie tegen influenza A/H1N1 2009 zitten minimaal drie weken.

Het briefadvies Vaccinatie tegen pandemische influenza A/H1N1 2009: doelgroepen en prioritering (2) (nr. 2009/12) is te downloaden van www.gr.nl en van <http://www.rivm.nl/nieuwe-influenza> (klik op informatie voor artsen) en in een papieren versie op te vragen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad, fax (070)3407523, e-mail: order@gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen worden verstrekt door dr. H. Houweling, tel. (070)340 66 25, e-mail: h.houweling@gr.nl en dr. K. Groeneveld, tel (070) 340 56 88, e-mail: k.groeneveld@gr.nl. Algemene informatie over de influenza A/H1N1 2009 kunt u vinden op www.grieppandemie.nl.